

Államilag elismert vörösborszőlő-fajták

Bíbor kadarka (Cs. 4.)

Származása	Kadarka x Muscat Bouschet (Kozma-Tusnádi)
Fenológia	Hosszú tenyészidejű, késői érésű fajta
Fagytűrése	Rendkívül érzékeny
Rothadás ellenállóság	Közepesen érzékeny
Egyéb ellenállóság/érzékenység	Szárazságtűrő
Megfelelő művelésmód	Magas művelésmódok (kivétel függöny)
Metszési igény	Rövid metszési elemek
Zöldmunkaigény	Erős növekedésű, sok zöldmunkát igényel
Termőképesség	Bőtermő
Minőség	Alacsony vagy átlagos (16-17 mustfok), magas savtartalom,
Bor	Mélyvörös színű, inkább házasításokhoz javasolható
Telepíthetőség	Engedélyezett a Szekszárdi, Tolnai, Csongrádi, Egri valamint a Kunsági borvidékek egyes körzeteiben
Klónok	-

Blauburger

Származása	Portugieser x Kékfrankos (Müllner- Ausztria)
Fenológia	Közepes tenyészidejű, középérésű
Fagytűrése	Jó
Rothadás ellenállóság	Közepesen érzékeny
Egyéb ellenállóság/érzékenység	
Megfelelő művelésmód	Magas művelésmódok
Metszési igény	Rövid vagy hosszú metszési elemek
Zöldmunkaigény	Erős növekedésű de szellős lombozatot nevel
Termőképesség	Bőtermő, de a szülőfajtáknál kisebb termésmennyiség
Minőség	18 feletti mustfok, alacsony savtartalom,
Bor	Mélyvörös színű, extraktban gazdag, közepes csersavtartalmú, lágy bor
Telepíthetőség	Ajánlott az Egri borvidék Egri és a Kunsági borvidék Kiskőrösi körzetében
Klónok	-

Cabernet franc

Származása	Convar. occidentalis, subconvar. gallica
Fenológia	Hosszú tenyészidejű, késői érésű
Fagytűrése	Kiváló
Rothadás ellenállóság	Kiváló
Egyéb ellenállóság/érzékenység	Szárazságra nem érzékeny
Megfelelő művelésmód	Alacsony vagy középmagas művelési módok
Metszési igény	Hosszú metszési elemek, ~ 10 rügy/m ² terhelés
Zöldmunkaigény	Sok hajtást és hónaljajtást nevel, erős növekedésű, kifejezetten zöldmunkaigényes
Termőképesség	Kis termőképesség
Minőség	Gyakran 20 feletti mustfok, harmonikus, vagy magas savtartalom
Bor	Mély színű, tanninban és extraktban gazdag, fűszeres
Telepíthetőség	Ajánlott a Bükkaljai, Balatonboglári, Etyek-Budai, Hajós-Bajai, Mátrai, Soproni, Szekszárdi, Tolnai, Villányi, Csongrádi, Egri, Mecsekaljai borvidékeken
Klónok	E.11.

Cabernet sauvignon

Származása	Cabernet franc x Sauvignon blanc (természetes hibrid)
Fenológia	Hosszú tenyészidejű, késői érésű
Fagytűrése	Jó
Rothadás ellenállóság	Kiváló
Egyéb ellenállóság/érzékenység	Termőhelyre és a virágzáskori időjárásra érzékeny
Megfelelő művelésmód	Alacsony vagy középmagas művelési módok
Metszési igény	Hosszú metszési elemek, ~ 8 rügym ² terhelés
Zöldmunkaigény	Erős növekedésű, sűrű lombú, zöldmunkaigényes
Termőképesség	Kis termőképesség
Minőség	Gyakran 20 feletti mustfok, harmonikus, magas savtartalom
Bor	Mély színű, polifenolokban és extraktban gazdag, hosszú érlelésre alkalmas
Telepíthetőség	Ajánlott a Bükkaljai, Balatonboglári, Etyek-Budai, Hajós-Bajai, Mátrai, Soproni, Szekszárdi, Tolnai, Villányi, Csongrádi, Egri, Mecsekaljai borvidékeken
Klónok	E.153; C. 15; E. 183

Duna gyöngye (CsVT 55.)

Származása	Seibel 4986 x Csaba gyöngye (Kozma P.)
Fenológia	Hosszú tenyészidejű, késői érésű
Fagyűrése	Kimagasló
Rothadás ellenállóság	Ellenálló
Egyéb ellenállóság/érzékenység	Gombás betegségeknek ellenáll, termőhelyre nem igényes
Megfelelő művelésmód	Magas művelésmódok
Metszési igény	Hosszúcsapos metszés, ~ 5 rügy/m ² terhelés
Zöldmunkaigény	Erős növekedésű, sok zöldmunkát igényel
Termőképesség	Bőtermő
Minőség	17-18 mustfok, magas savtartalom jellemzi
Bor	Semleges karakterű, savban és polifenolokban gazdag
Telepíthetőség	Engedélyezett fajta a Kunsági borvidék egyes körzeteiben
Klónok	-

Kadarka (Gamza, Fekete budai, Törökszőlő)

Származása	Convar. pontica, subconv. Balcanica
Fenológia	Hosszú tenyészidejű, késői érésű
Fagytűrése	Nagyon érzékeny
Rothadás ellenállóság	Nagyon érzékeny
Egyéb ellenállóság/érzékenység	Jó szárazságtűrő, talajra nem igényes
Megfelelő művelésmód	Alacsony művelésmódokra (fej, bak, kordon) javasolható
Metszési igény	Rövidcsapos metszés, ~4 rügy/m ² terhelés
Zöldmunkaigény	Generatív fajta, kevés számú, merev hajtással
Termőképesség	Bőtermő (termékenyüléstől függően)
Minőség	16 feletti mustfok, magas savtartalom
Bor	Világos színű, fűszeres vörösbor, vagy siller
Telepíthetőség	Ajánlott fajta a Hajós-Bajai, Szekszárdi, Tolnai, Csongrádi, Kunsági és Egri borvidékek egyes körzeteiben
Klónok	P.9, Kt.4

Kékfrankos (Limberger, Frankovka, Moravka)

Származása	Convar. orientalis, subconv. caspica
Fenológia	Közepes vagy késői érés jellemzi
Fagytűrése	Jó
Rothadás ellenállóság	Nem érzékeny
Egyéb ellenállóság/érzékenység	Talajra kevésbé érzékeny
Megfelelő művelésmód	Alacsony vagy magas kordonművelések, ernyő
Metszési igény	Rövidmetszés, 4-6 rügy/m ² terhelés
Zöldmunkaigény	Kevés hajtás, szellős lombfal
Termőképesség	Bőtermő
Minőség	Rendszerint közepes vagy magas (17-19) mustfok, magas savtartalom
Bor	Rubinvörös, csersavban gazdag, közepes extrakttartalommal
Telepíthetőség	Valamennyi vörösbort előállító borvidékünkön ajánlott vagy engedélyezett
Klónok	G.379, Kt.1

Kékmedoc (Médoc noir, Menaire)

Származása	Convar. orientalis, subconv. caspica
Fenológia	Rövid tenyészidejű, korai érésű
Fagytűrése	Közepes
Rothadás ellenállóság	Érzékeny
Egyéb ellenállóság/érzékenység	Tápanyagban gazdag talajokat kedveli Termését gyakran károsítják a vadak és a darazsak
Megfelelő művelésmód	Középmagas vagy magas művelésmódok (ernyő)
Metszési igény	Hosszú metszést, 6-8 rügy/m ² terhelés
Zöldmunkaigény	Közepes számú hajtás, sok másodfűrt, kevés zöldmunkát igényel
Termőképesség	Közepes
Minőség	Magas (18-22) mustfok, alacsony savtartalom
Bor	Extraktban gazdag, fűszeres illatú és zamatú, lágy bor
Telepíthetőség	Engedélyezett az Egri és a Villányi borvidékeken
Klónok	-

Medina (Egri csillagok 7)

Származása	Eger 1 x Médoc noir (Csizmazia-Bereznai)
Fenológia	Rövid tenyészidejű, korai érésű
Fagyűrése	Jó fagyűrő
Rothadás ellenállóság	Ellenálló
Egyéb ellenállóság/érzékenység	A gombás megbetegedéseknek (peronoszpóra, lisztharmat) jól ellenáll
Megfelelő művelésmód	Középmagas vagy magas művelésmódok (ernyő)
Metszési igény	Hosszú metszés szükséges
Zöldmunkaigény	Szellős lombú, kevés zöldmunkát igényel
Termőképesség	Bőtermő
Minőség	Rendszerint 17-19 mustfokkal és alacsony savtartalommal érik be
Bor	Fűszeres-muskotályos zamatú, közepes színintenzitású
Telepíthetőség	Engedélyezett a Bükkaljai borvidéken és a Kunsági borvidék egyes körzeteiben
Klónok	-

Merlot

Származása	Conv. occidentalis, subconv. gallica
Fenológia	Hosszú tenyészidejű, késői érésű
Fagyűrése	Érzékeny
Rothadás ellenállóság	Közepes
Egyéb ellenállóság/érzékenység	Vízigényes, virágzáskori időjárásra érzékeny
Megfelelő művelésmód	Alacsony vagy középmagas művelési módok
Metszési igény	Hosszú metszési elemek, ~ 8 rügy/m ² terhelés
Zöldmunkaigény	Erős növekedésű, rendkívül sűrű lombú,
Termőképesség	Közepes
Minőség	Gyakran 20 feletti mustfok, harmonikus savtartalom
Bor	Bársonyos, harmonikus, komplex
Telepíthetőség	Ajánlott a Bükkaljai, Balatonboglári, Etyek-Budai, Soproni, Szekszárdi, Tolnai, Villányi, Egri, Mecsekaljai borvidékeken
Klónok	C. 348

Pinot noir (Kék burgundi, Blauer Burgunder)

Származása	Conv. occidentalis, subconv. gallica
Fenológia	Középérésű
Fagytűrése	Jó
Rothadás ellenállóság	Közepes
Egyéb ellenállóság/érzékenység	
Megfelelő művelésmód	Főként középmagas vagy magas művelési módok
Metszési igény	Szálvesszős metszés (6-8 rügy/m ² terhelés)
Zöldmunkaigény	Ritka lombozat, kevés zöldmunka
Termőképesség	Közepes
Minőség	Magas mustfok és savtartalom
Bor	Téglavörös színű, testes, fűszeres, érlelhető borok
Telepíthetőség	Ajánlott az Etyek-Budai, Soproni, Szekszárdi, Tolnai, Villányi, Egri, Balatonfelvidéki, Mecsekaljai borvidékeken
Klónok	M.2., C.113, C. 162

Portugieser (Kékoportó, Oportó)

Származása	Conv. orientalis, subconv. caspica
Fenológia	Rövid tenyészidejű, korai érésű
Fagytűrése	Közepes
Rothadás ellenállóság	Rendkívül érzékeny
Egyéb ellenállóság/érzékenység	
Megfelelő művelésmód	Magas művelésekre javasolható
Metszési igény	Hosszúcspos vagy szálvesszős (4-6 rügy/m ² terhelés)
Zöldmunkaigény	Erős növekedés, ritka lombozat, elfekvő hajtások és intenzív hónaljajtás-képződés jellemzi
Termőképesség	Bőtermő
Minőség	Termésátlagtól függően 15-20 mustfok, alacsony savtartalom
Bor	Lágy karakterű, közepes cersavtartalmú és színintenzitású, gyorsan érő
Telepíthetőség	Ajánlott az Etyek-Budai, Villányi, Egri, Balatonfelvidéki, borvidékeken
Klónok	Kt.1.

Turán (Bikavér 13)

Származása	Bikavér 8 x Gárdonyi Géza (Csizmazia-Bereznai)
Fenológia	Rövid tenyészidejű, korai érésű
Fagytűrése	Közepes
Rothadás ellenállóság	Érzékeny (túlérésben)
Egyéb ellenállóság/érzékenység	
Megfelelő művelésmód	Magas művelésmódok
Metszési igény	Hosszúcsapos vagy szálvesszős metszés
Zöldmunkaigény	Közepes zöldmunkaigény
Termőképesség	Közepes
Minőség	Magas mustfok, alacsony savtartalom, festőlevű
Bor	Mélyvörös színű, enyhén muskotályos, bársonyos
Telepíthetőség	Engedélyezett az Etyek-Budai, Mátrai, Egri, Kunsági borvidékeken
Klónok	-

Zweigelt

Származása	Kékfrankos x Szent Lőrinc (Zweigelt- Ausztria)
Fenológia	Közepes tenyészidejű, középérésű
Fagytűrése	Jó
Rothadás ellenállóság	Közepesnél jobb
Egyéb ellenállóság/érzékenység	Időnként rosszul termékenyül, kocsánybénulásra hajlamos
Megfelelő művelésmód	Magas művelésmódok
Metszési igény	Rövid metszés, kis terhelést igényel
Zöldmunkaigény	Szellős lombozatot nevelő, generatív fajta
Termőképesség	Rendkívül bőtermő
Minőség	Kis termésátlag mellett közepes vagy magas cukortartalom, magas savtartalom
Bor	Lilás árnyalatú, fajtajelleges, kemény karakterű
Telepíthetőség	Ajánlott a Bükkaljai, Etyek-budai, Hajós-Bajai, Soproni, Szekszárdi, Tolnai, Balatonfelvidéki, Csongrádi és a Kunsági borvidékeken
Klónok	-