

***A csemegeszőlő-fajták termesztési
értékét meghatározó jellemzők***

Termésminőség

- **A csemegeszőlő-fajták minősége**

- cukor- és savtartalom mellett az ízharmonia és a tetszetősség is fontos
- A nagy, laza fürtű és nagy bogyójú fajták a legpiacosabbak
- fontos minőségi tényező a bogyók egyöntetűsége (méret, színeződés)
- egyenlőtlen bogyóméret: Zala gyöngye
- egyenlőtlen színeződés: Hamburgi muskotály, Cardinal
- színeződés: sárgászöld, vagy aransárga bogyószín kedvezőbb
- optimális cukor/sav arány: 20-25
- speciális illat és zamatanyagok jelenléte
- magvatlan szőlőfajták, magvak száma és mérete
- bogyóhús állaga ► a pektintartalom meghatározó

További jellemzők

- **Szállíthatóság**

- ▶ Szakítási szilárdság: 69-2868 g
- ▶ Nyomási ellenállóság: 300-3000 g
- ▶ Rugalmasság: nyomás alatti alakváltozás

- **Eltarthatóság**

A laza fürtű, nagy bogyójú, késői érésű fajták jobban eltarthatóak:
- Chasselas, Attila, Afúz Ali, Téli muskotály

Államilag elismert csemegeezőző-fajták

Afuz Ali (Razaki, Bolgár, Datolyaszőlő)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Származása | Convar. occidentalis subconvar. Antasiatica |
| Fenológia | Hosszú tenyészidejű, igen késői érésű |
| Fagyűrése | Fagyérzékeny |
| Rothadás ellenállóság | Ellenálló |
| Egyéb ellenállóság/érzékenység | Tápanyagban és vízben jól ellátott talajokat kedveli |
| Megfelelő művelésmód | Magas művelésmódok |
| Metszési igény | Szálvesszős metszés (alsó rügyek terméketlenek) |
| Zöldmunkaigény | Erős növekedésű, de ritka lombú fajta, sok másodfürttel |
| Termőképesség | Bőtermő (kevés fürt, de igen nagy fürtméret) |
| Minőség | Alacsony cukor- és savtartalom |
| Szállíthatóság, eltarthatóság | Nagy méretű, jól szállítható, piacos fürtök |
| Telepíthetőség | Minden borvidéken és bortermő helyen |
| Klónok | - |

Cardinal (Kardinal)

| | |
|---------------------------------------|--|
| Származása | Flame Tokay x Ribier (Snyder-Harmon, USA) |
| Fenológia | Rövid tenyészidejű, igen korai érésű |
| Fagyűrése | Fagyérzékeny |
| Rothadás ellenállóság | Nagyon érzékeny |
| Egyéb ellenállóság/érzékenység | Gyakori a rendellenes fejlődésű és méretű bogyó |
| Megfelelő művelésmód | Magas művelésmódok |
| Metszési igény | Rövidmetszés |
| Zöldmunkaigény | Sűrűlombozat, sok zöldmunkát igényel |
| Termőképesség | Közepes termőképesség |
| Minőség | Hatalmas fürt- és bogyóméret, egyenlőtlen színeződés, ropogós, savban szegény, magas cukortartalmú bogyó |
| Szállíthatóság, eltarthatóság | Jól szállítható, hűtőházban jól tárolható |
| Telepíthetőség | Minden borvidéken és bortermő helyen |
| Klónok | - |

Cegléd szépe (Belle de Cegléd, Schöne von Cegléd)

| | |
|---------------------------------------|--|
| Származása | Chasselas blanc x Chasselas rouge (Mathiász J.) |
| Fenológia | Középérésű |
| Fagytűrése | Jól ellenáll |
| Rothadás ellenállóság | Közepes |
| Egyéb ellenállóság/érzékenység | Tápanyagban és vízben gazdag talajokat igényel |
| Megfelelő művelésmód | Magas művelésmódok |
| Metszési igény | Hosszú metszést igényel |
| Zöldmunkaigény | Gyenge növekedésű, kevés hajtást nevel |
| Termőképesség | Kis termőképesség |
| Minőség | Közepes méretű fürt, közepes cukortartalom, savszegény |
| Szállíthatóság, eltarthatóság | Jól szállítható és eltartható |
| Telepíthetőség | Minden borvidéken és bortermő helyen |
| Klónok | K. 73 |

Chasselas (fehér és piros)

| | |
|---------------------------------------|--|
| Származása | Convar. orientalis, subconv. caspica |
| Fenológia | Korai érésű |
| Fagytűrése | Jó fagytűrő |
| Rothadás ellenállóság | Jól ellenáll |
| Egyéb ellenállóság/érzékenység | Tápanyagban és vízben gazdag talajokat igényel |
| Megfelelő művelésmód | Alacsony vagy magas művelésmódok |
| Metszési igény | Hosszú metszés |
| Zöldmunkaigény | Laza lombozatú |
| Termőképesség | Közepes termőképesség |
| Minőség | Közepes méretű, tetszetős fürtök, harmonikus cukor/sav aránnyal, borkészítésre is alkalmas |
| Szállíthatóság, eltarthatóság | Jól szállítható és tárolható |
| Telepíthetőség | Minden borvidéken és bortermő helyen |
| Klónok | Fr. 38-95, K.16, C.60 (fehér); Fr. 36-28, K.18, C.61 (piros) |

Csaba gyöngye (Pearl of Csaba, Perle de Csaba)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Származása | Bronnerstraube x Ottonel musk. (Mathiász J.-Stark A.) |
| Fenológia | Igen korai érésű |
| Fagyűrése | Jó fagyűrés |
| Rothadás ellenállóság | Rendkívül érzékeny |
| Egyéb ellenállóság/érzékenység | Tápanyagban és vízben gazdag talajokat igényel Termését a madarak és a darazsak károsítják |
| Megfelelő művelésmód | Magas művelésmódok |
| Metszési igény | Hosszú metszés + kis rügyterhelés |
| Zöldmunkaigény | Erős növekedésű, ritka lombú dajta |
| Termőképesség | Közepes fűrtméret és termőképesség (sok másodfűrt) |
| Minőség | Harmonikus cukor-sav arány, muskotályos íz, |
| Szállíthatóság, eltarthatóság | Rosszul szállítható és tárolható |
| Telepíthetőség | Minden borvidéken és bortermő helyen |
| Klónok | - |

Favorit (514-12)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Származása | Chasselas Queen Victoria White x Szőlőskertek királynője muskotály (Szegedi S.) |
| Fenológia | Igen korai érésű |
| Fagytűrése | Fagyérzékeny, de jól regenerálódik |
| Rothadás ellenállóság | Közepes |
| Egyéb ellenállóság/érzékenység | Talajjal szemben kevésbé igényes, Termését a madarak és a darazsak károsítják |
| Megfelelő művelésmód | Magas művelésmódok |
| Metszési igény | Hosszú metszés |
| Zöldmunkaigény | Laza lombozatú |
| Termőképesség | Bőtermő, középnagy fürtökkel |
| Minőség | Tetszetős fürtök, finom, muskotályos íz |
| Szállíthatóság, eltarthatóság | Jól szállítható és tárolható |
| Telepíthetőség | Minden borvidéken és bortermő helyen |
| Klónok | - |

Hamburgi muskotály (Muscat de Hambourg)

| | |
|---------------------------------------|--|
| Származása | Alexandria muskotály x Frankenthali (?) |
| Fenológia | Hosszú tenyészidő, késői érés |
| Fagytűrése | Közepes |
| Rothadás ellenállóság | Közepes |
| Egyéb ellenállóság/érzékenység | Késői érése miatt meleg fekvéseket igényel Termékenyülése gyakran hiányos |
| Megfelelő művelésmód | Magas kordonművelések |
| Metszési igény | Hosszú metszés |
| Zöldmunkaigény | Sűrű lombozatot nevel, sok zöldmunkát igényel |
| Termőképesség | Nagy, laza fürtméret, bőtermő |
| Minőség | Tetszetős fürtök, finom, muskotályos íz, harmonikus cukor/sav arány |
| Szállíthatóság, eltarthatóság | Kocsányzata könnyen törik, bogyói pergésre hajlamosak |
| Telepíthetőség | Minden borvidéken és bortermő helyen |
| Klónok | - |

Irsai Olivér

| | |
|---------------------------------------|---|
| Származása | Pozsonyi x Csaba gyöngye (Kocsis P.) |
| Fenológia | Rövid tenyészidejű, igen korai érésű |
| Fagyűrése | Közepes |
| Rothadás ellenállóság | Túlérésben rothadásra hajlamos |
| Egyéb ellenállóság/érzékenység | Termését a madarak és a darazsak kedvelik |
| Megfelelő művelésmód | Magas kordonművelések |
| Metszési igény | Hosszú metszés |
| Zöldmunkaigény | Elhajló hajtásokat nevel, sok zöldmunkát igényel |
| Termőképesség | Középnagy fürt, közepes termőképesség |
| Minőség | Kis bogyói miatt kevésbé piacos, inkább borkészítésre használják: alacsony savtartalmú, muskotályos borok |
| Szállíthatóság, eltarthatóság | Jól szállítható, tárolásra kevésbé alkalmas |
| Telepíthetőség | Minden borvidéken és bortermő helyen |
| Klónok | K.11 |

Itália (Muscat Italia, Pirovano 65)

| | |
|---------------------------------------|--|
| Származása | Chasselas Napoleon x Hamburgi muskotály (Pirovano) |
| Fenológia | Hosszú tenyészidejű, igen késői érésű |
| Fagytűrése | Közepes |
| Rothadás ellenállóság | Jól ellenáll |
| Egyéb ellenállóság/érzékenység | Kifejezetten meleg fekvések szükségesek a beéréséhez |
| Megfelelő művelésmód | Magas kordonművelések, lugasok |
| Metszési igény | Hosszú metszés, kis terhelés |
| Zöldmunkaigény | Kevés zöldmunkát igényel |
| Termőképesség | Igen nagy fürtű, bőtermő |
| Minőség | Beérése esetén megfelelő cukor/sav arány, nagyon kellemes muskotályos íz |
| Szállíthatóság, eltarthatóság | Jól szállítható és tárolható |
| Telepíthetőség | Minden borvidéken és bortermő helyen |
| Klónok | |

Nero (Bornemissza Gergely 15)

| | |
|---------------------------------------|--|
| Származása | Eger 2 x Gárdonyi Géza (Csizmazia-Bereznai) |
| Fenológia | Korai érésű |
| Fagytűrése | Jó fagytűrő |
| Rothadás ellenállóság | Közepesen érzékeny |
| Egyéb ellenállóság/érzékenység | Gombás betegségeknek (peronoszpóra, lisztharmat) ellenáll |
| Megfelelő művelésmód | Magas művelésekre alkalmas |
| Metszési igény | Terhelését célszerű csökkenteni (5-7 rügy/m ²) |
| Zöldmunkaigény | Erős növekedésű, de ritka lombozatot nevel |
| Termőképesség | Bőtermő |
| Minőség | Tetszetős fürtök, magas cukortartalom, fűszeres zamat, nagy magvak |
| Szállíthatóság, eltarthatóság | Jól szállítható és tárolható, borkészítésre is alkalmas |
| Telepíthetőség | Minden borvidéken és bortermő helyen |
| Klónok | - |

Palatina (Augusztusi muskotály)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Származása | Seyve-Villard 12375 x Szőlőskertek királynője musk (Kozma P.) |
| Fenológia | Igen korai érésű |
| Fagytűrése | Kimagasló fagytűrés jellemzi |
| Rothadás ellenállóság | Ellenálló |
| Egyéb ellenállóság/érzékenység | Gombás betegségeknek (peronoszpóra, lisztharmat) ellenáll, termőhelyre kevésbé érzékeny |
| Megfelelő művelésmód | Magas művelések: kordon, vagy lugasművelések |
| Metszési igény | Rövid vagy hosszúcsapos metszés |
| Zöldmunkaigény | Sűrű hajtásrendszerű |
| Termőképesség | Bőtermő |
| Minőség | Tetszetős fürtök, aranysárga bogyók, enyhén muskotályos zamattal |
| Szállíthatóság, eltarthatóság | Jól szállítható és tárolható |
| Telepíthetőség | Minden borvidéken és bortermő helyen |
| Klónok | - |

Pannónia kincse (Pannónia, Póczik 2.)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Származása | Szőlőskertek királynője musk. X Cegléd szépe (Póczik F.) |
| Fenológia | Igen korai érésű |
| Fagyűrése | Fagyérzékeny |
| Rothadás ellenállóság | Közepes |
| Egyéb ellenállóság/érzékenység | Talajra nem igényes, szárazságtűrő |
| Megfelelő művelésmód | Magas művelések |
| Metszési igény | Rövid vagy hosszúcsapos metszés |
| Zöldmunkaigény | Sűrű hajtásrendszerű, sok zöldmunkát igényel |
| Termőképesség | Bőtermő, nagy fürtű |
| Minőség | Tetszetős fürtök, nagy bogyóval, optimális cukor-sav aránnyal |
| Szállíthatóság, eltarthatóság | Bogyói szállítás során könnyen barnulnak |
| Telepíthetőség | Minden borvidéken és bortermő helyen |
| Klónok | - |

Pölöskei muskotály (R.10)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Származása | Zalagyöngye x (Gloria Hungariae x Erzsébet Királyné emléke) (Szegedi S.) |
| Fenológia | Középérésű |
| Fagytűrése | Közepes |
| Rothadás ellenállóság | Ellenálló |
| Egyéb ellenállóság/érzékenység | A gombás betegségeknek ellenáll, terhelésre érzékeny |
| Megfelelő művelésmód | Magas művelések:kordon, lugas |
| Metszési igény | Hosszúcsapos vagy szálvesszős metszés |
| Zöldmunkaigény | Sűrű hajtásrendszerű, sok zöldmunkát igényel |
| Termőképesség | Bőtermő, nagy fürtű |
| Minőség | Tetszetős fürtök, bogyói esetenként zöldek maradnak (túlterhelés), kissé vastag héj, finom muskotályos íz |
| Szállíthatóság, eltarthatóság | Jól szállítható és tárolható |
| Telepíthetőség | Minden borvidéken és bortermő helyen |
| Klónok | - |

Szőlőskertek királynője muskotály

| | |
|---------------------------------------|--|
| Származása | Erzsébet Királyné emléke x Csaba gyöngye (Mathiász) |
| Fenológia | Igen korai érésű |
| Fagyűrése | Fagyérzékeny |
| Rothadás ellenállóság | Érzékeny |
| Egyéb ellenállóság/érzékenység | Talaj és fekvés iránt érzékeny |
| Megfelelő művelésmód | Magas művelések (kivétel fagyveszélyes zónák) |
| Metszési igény | Rövidmetszést igényel, túlterhelésre érzékeny |
| Zöldmunkaigény | Kevés zöldmunkát igényel |
| Termőképesség | Bőtermő |
| Minőség | Nagy fürtű, alacsony cukor és savtartalom mellett intenzív muskotályos íz jellemzi |
| Szállíthatóság, eltarthatóság | Szállításra és tárolásra érzékeny |
| Telepíthetőség | Minden borvidéken és bortermő helyen |
| Klónok | - |